Бережіть себе та своїх близьких!

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Кіровоградської області

Пам’ятка населенню

АЛЕРГІЯ НА КОМАХ

м. Кропивницький

Наша адреса:

Україна, 25009, Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул.Глинки, будинок 2
тел. 0522 330015
e-mail: nmc.kirovohrad@dsns.gov.ua
сайт: www.kr.dsns.gov.ua
ми у Facebook:

Хто жалить?

Тільки самки перетинчастокрилих. Бджоли зазвичай жалять навесні й у перші місяці літа, а оси – з серпня по вересень.

Бджоли і джмелі жалять лише захищаючись. Серед усіх перетинчастокрилих тільки у бджоли є зазубрене жало, яке залишається в тілі жертви. Це призводить до загибелі комахи. Джмелі жалять рідко і жала не залишають.

Оси гніздяться в землі, їх можна легко потривожити під час садових робіт. Оси концентруються навколо сміттєзбірників, часто будують гнізда з сотами на кілька особин під карнизами і балками, на горищах і балконах. Ці комахи агресивні й можуть нападати першими.

Шершні гніздяться в кущах, тому важливо бути особливо обережним під час обрізання гілок. На поодинокі укуси зазвичай загальної реакції не виникає. Токсичні укуси більше ніж 5 бджіл, а кількох сотень – смертельні. Під час укусу (навіть однократного) в кровоносну судину загальні реакції миттєві та виражені. Особливо небезпечні укуси в ділянках глотки, гортані, порожнини рота.

Перша допомога

- Зберігайте спокій. Більшість видів бджіл жалять лише один раз, та оси й шершні можуть жалити повторно. Якщо вас вкусили, повільно відійдіть від того місця, щоб уникнути нових атак.
- Вийміть жало, потерши його нігтем або шматком марлі. Не рекомендується використовувати пінцет, адже здавлювання отруйного мішка прискорить потрапляння отрути в рану.
- Промийте уражену ділянку шкіри з милом.
- Охолодіть (льодом, холодною водою) місце укусу і забезпечте спокій, місце укусу не можна розчісувати.
- За потреби прийміть знеболювальний і антигістамінний засіб.

Ранозагоювальні мазі рекомендується використовувати лише після консультації з лікарем.

Важливо! Якщо набряк починає поширюватися на інші ділянки тіла (шию, обличчя), утруднюється дихання, з'являється нудота, запаморочення або кропив'янка, слід негайно звернутися по медичну допомогу.

Як уникнути або знизити ризик укусів?

- не робіть різких рухів, якщо комаха літає поруч (таку поведінку вона сприймає як загрозу, відповіддю на яку може бути укус);
- не їжте просто неба, особливо солодке;
- комах приваблюють квіткові аромати, отже, використання парфумів з подібними ароматами може обернутися неприємною ситуацією;
- привабити комах можуть і захисні лосьйони від засмаги, якщо у їх складі є віск;
- ос і бджіл приваблює одяг яскравих кольорів.
- носіть закритий одяг (ліпше світлих тонів);
- не ходіть босоніж по траві (через небезпеку наступити на комах);
- уникайте сильних фізичних навантажень (піт приваблює комах);
- не вбивайте комах близько біля гнізд або вуликів (розчавлена комаха приваблює своїм запахом інших);
- носіть головні убори, адже комаха, яка заплуталася у волоссі, обов'язково вкусить;
- будьте уважні, пам'ятайте, що гнізда комах можуть бути в траві, чагарниках, на горищах, у покинутих приміщеннях.

Чим небезпечна отрута?

В отруті перетинчастокрилих містяться речовини, здатні призвести до розширення судин і підвищення їх проникності. Токсичні ефекти під час укусів пов'язані з основними пептидами або фосфоліпідами: у бджіл це мелітин, в ос – нейротоксин.

Біологічний вплив отрути перетинчастокрилих можна виразити як сумарний ефект чотирьох видів токсичної дії отрути:

- геморагічної;
- гемолітичної;
- нейротоксичної;
- гістаміноподібної.